

FINCH

urbalive

by plastia



www.urbalive.cz
www.urbalive.com



NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ A ÚDRŽBU KRMÍTKA FINCH

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DAS VOGELFUTTERHAUS FINCH

**DIRECTIONS FOR LOCATION AND MAINTENANCE
OF THE FINCH BIRD FEEDER**

CZ

DE

ENG

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ A ÚDRŽBU KRMÍTKA FINCH

Finch v překladu znamená pěnkava resp pěnkavovitý pták. A právě pěnkava, zvonek či dlask se mohou stát ozdobou vašeho nového krmítka FINCH. Společně s mnoha jinými druhy ptáků, kteří zejména v mrazivém počasí uvítají stálý přísun potravy. Ptáci a lidé odedávna patřili k sobě, tak jako naši předci obdivujeme jejich schopnost létat a na jaře se těšíme z jejich zpěvu. Na zahradách jsou ptáci vítanými pomocníky při hubení hmyzích škůdců. Díky příkrmování se můžeme těšit z blízké přítomnosti našich opeřených přátel a současně jím pomáháme přežít náročné zimní období.

UMÍSTĚNÍ KRMÍTKA

Krmítko FINCH můžeme umístit třemi způsoby – a to zavěšením, připevněním na zábradlí nebo umístěním na tyč do prostoru. Krmítko Finch můžete zavěsit například na strom, zde je ovšem nutné zvážit nebezpečí napadení predátory (např. kočka či kuna). Pokud však bude krmítko volně umístěno do prostoru, nebezpečí napadení se

značně sníží. Umístění krmítka by mělo být alespoň 1,5 metru nad zemí.

V případě, že krmítko nepoužijete jako závěsné, ponechte upevněnou stříšku pomocí šňůrky a brzdičky.

Obecně krmítko umisťujeme do přehledné a klidné části zahrady, kde nefouká silný vítr, s přirozenými úkryty jako jsou stromy a keře, které by nicméně neměly být blíže než 2 metry, aby se v nich nemohli schovávat zmínění predátoři.



Doporučujeme upevnit krmítko na zábradlí stahovací páskou o velikosti 29 cm x 3,5 mm.

ČÍM KRMÍT

Krmíme především tučnými semeny obilovin, zejména slunečnicí, možno i lnem, prosem, pohankou nebo jádry vlašských a lískových ořechů. Ptákům můžete nabídnout i ovesné vločky, neslané pečivo nebo i strouhanou mrkev, popř. čerstvé, na kousky nakrájené maso.

Pod krmítko je možné pohodit jablka, na kterých si rádi pochutnají kosi. Vedle krmítka zase můžete zavěsit hovězí lůj nebo kupované lojové koule.

Směs krmiva nasypeme do středního, průhledného dílu krmítka po zvednutí stříšky.

Objem nádobky na krmivo 1,3 l.



TIP!!: Pokud si na ptáčky vzpomenete už na podzim a při procházkách budete sbírat plody šípků,

jeřabin, bezu černého, hlohu, rakytníku, břečťanu, svídy, semena bodláků, sušená jablka nebo švestky, připravíte v zimě opravdovou ptačí hostinu, na kterou se sletí ptáci z celého okolí.

ČÍM NEKRMIT

Potrava předkládaná do krmítka musí být především kvalitní a nezkažená. Nikdy nedáváme zbytky od stolu, cukroví, těstoviny, uzené výrobky, slané a kořeněné jídlo. Čerstvé pečivo je pro ptáky naprosto nevhodné a způsobuje ptákům zažívací problémy. Vepřové sádlo je také nevhodné, ptáci jej těžce tráví, na rozdíl od hovězího loje.

ÚDRŽBA

Krmítko je třeba pravidelně čistit. Odstraňujeme vyloupaná semena a slupky, zbytky trusu a nespotřebované potravy. Při pozorování ptáků zjevně nemocných (malátnost, abnormální kožní útvary např. v okolí očí a zobáku, mokré peří aj.), přestaneme na čas krmit, krmítko vydesinfikujeme a necháme důkladně vyschnout, abychom předešli šíření původců onemocnění.

KDO CHCE CO?

Strakapoudi – nejraději konzumuji lůj nebo tukovou směs

Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové, vrabci a kosi – semena plevelů a obilovin, olejnatá semena

Sýkory (koňadra, modřinka, babka, uhelníček, parukářka), brhlík, šoupálek – olejnatá semena, lůj, tuková směs

Kosi a kvíčaly – plody nejrůznějších bobulovin, jablka

Červenka – strouhanka, drobná semínka, tuková směs, popř. mouční červi.

KDY KRMÍT

S příkrmováním začínáme v průběhu pozdního podzimu, ideálně začátkem listopadu. V přírodě je ještě relativně dostatek potravy, ptáci netrpí nedostatkem potravy a na vaše krmítko si zaletí pro zpestření jídelníčku. Až udeří silné mrazy a napadne sníh, už o krmítku budou vědět a poletí na jistotu.

Krmivo podáváme pravidelně, za mrazů nebo vysoké sněhové pokrývky je dobré dávky zvyšovat. Krmení je vhodné ukončit s nástupem teplého počasí, chceme-li přece jen přikrmovat i během jara a léta, musíme zvýšeně dbát na čistotu krmítka, abychom v teplém počasí předešli snadnému přenosu nemocí. V případě zjištění přítomnosti nemocných ptáků krmení okamžitě ukončíme!

Krmítko Finch doporučuje Česká společnost ornitologická , www.birdlife.cz



GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DAS VOGELFUTTERHAUS FINCH

FINCH heisst Fink und zusammen mit vielen anderen Vogelarten besonders bei kaltem Wetter eine stetige Versorgung mit Nahrung begrüßen. Vögel und Menschen gehören immer zusammen, so wie unsere Vorfahren bewundern wir ihre Fähigkeit fliegen zu können und im Frühling freuen wir uns über ihr Vogelgezwitscher In unseren Garten sind Vögel willkommene Helfer gegen Insektenschädlinge. Dank Fütterung können wir die Nähe unserer gefiederten Freunde genießen, und wir helfen ihnen die schwierige Winterperiode zu überleben.

PLATZIERUNG DES FUTTERHÄUSCHENS

Vogelfutterhaus FINCH kann auf drei Arten positioniert werden – Aufhängen, Montage auf's Geländer oder auf eine Stange im freien Raum. Vogelfutterhaus Finch kann zum Beispiel an einem Baum aufgehängt werden, hier besteht jedoch das Risiko eines Angriffs durch Raubtiere (z. B. eine Katze oder einen Marder). Beim Aufstellen in einen freien

Raum wird die Angriffgefahr erheblich reduziert.
Das Vogelfutterhaus ist mindestens 1,5 m über dem Boden zu befestigen.

Für den Fall, dass Sie das Vogelfutterhaus nicht Aufhängen, lassen Sie das Dach mit Hilf von Schnur und Schnalle befestigen.

Allgemein ist es zu empfohlen, das Vogelfutterhaus in einen transparenten und ruhigen Teil des Gartens zu platzieren, wo kein starker Wind bläst, mit Naturschutzhütten wie Bäume und Gebüsch, die jedoch nicht näher als zwei Meter sein sollten, so dass keine Räuber hinverstecken konnten.



Wir empfehlen den Vogelfutterhaus auf das Geländer mit Kabelbinder 29 cm x 3,5 mm zu fesseln.

WOMIT FÜTTERN

Wir füttern hauptsächlich fetthaltigen Samen von Getreide, Sonnenblumen und Leinsamen, Hirsen, Buchweizen oder Walnüssen und Haselnüssen. Vögel können auch mit Haferflocken, Gebäck oder geriebenen Karotten bzw. frischem, gehacktem Fleisch gefüttert werden.

Unter das Vogelfutterhaus können wir Äpfel hinwerfen, die Amsel gerne genießen; neben dann Rinderfett oder gekaufte Talgkugel aufhängen.

Futtermischung wird in das transparente Mittelteil des Vogelfutterhauses aufgeschüttet.

Der Umfang des Mitelteiles für Futtermischung ist 1,3 L.



Ratschlag! Denken Sie an die Vögel während ihrer Herbstwanderungen und sammeln Sie Früchte von

Hagebütten, Beeren, Holunder, Weißdorn, Sanddorn , Efeu, Hartriegel , Distel Samen, getrocknete Äpfel oder Pflaumen, und bereiten Sie im Winter für alle Vögel aus der ganzen Nachbarschaft ein echtes Mahl vor.

WOMIT NICHT FÜTTERN

Vogelfutter, die wir ins Vogelfutterhaus ausstreuen, soll gute Qualität haben und nicht verdorben sein. Keine Speiseresten, Süßigkeiten, Nudeln, Wurst , salzige und würzige Speisen hingeben. Frisches Brot ist für Vögel völlig ungeeignet, verursacht Verdauungsprobleme. Schmalz ist für Vögel schwer verdaulich, im Gegensatz zum Talg.

WARTUNG

Das Vogelfutterhaus soll regelmäßig gereinigt werden. Geschälte Samen, Schalen, Kot- und Futterreste sind regelmäßig zu entfernen. Falls offenbar kranke Vögel zu beobachten sind (Schwäche, ungewöhnliche Haut Formationen z. B. im Augen- oder Schnabelbereich, nasse Federn etc.) hören wir auf zu füttern. Das Vogelfutterhaus ist sorgfältig zu reinigen und auszutrocknen.

Nur so wird die Verbreitung von Krankheitserregern vermeiden.

WER WILL WAS?

Buntspecht – bevorzugen Talg und Fettmischung-
Fink, Grünfink, Ammer, Kernbeißer , Sperling, Amsel
- Unkrautsamen und Getreide, Ölsaaten Meise
(Kohlmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, Tannenmeise,
Haubenmeise), Kleiber, Gartenbaumläufer-
Ölsaaten, Talg und Fettmischung Amseln und
Wacholderdrosseln – Früchte von verschiedenen
Beeren, Äpfel Rotkehlchen – Semmelbrösel , kleine
Samen, Fettmischung, bzw. Mehlwürme.

WANN FÜTTERN

Mit einer Zufütterung beginnen wir im Spätherbst , im Idealfall Anfang November. In der Natur ist es noch relativ genügend Nahrung, die Vögel leiden nicht unter Futtermangel und sie kommen in ihrem Vogelfutterhaus nur dadurch, um die Ernährung bunter zu haben.Wenn ein starker Frost und Schnee kommt, wissen die bereits über das Vogelfutterhaus und fliegen sicher. Futter soll regelmäßig

nachgefüllt werden. Beim kalten Wetter oder hoher Schneedecke ist gut, die Menge zu erhöhen. Mit der Fütterung hören wir mit dem Beginn des warmen Wetters auf. Möchten wir trotzdem auch im Frühjahr und im Sommer zufüttern, sollen wir mehr auf Sauberkeit achten. Besonders beim warmen Wetter sollen wir die Krankheitsübertragung verhindern. Bei Anwesenheit von kranken Vögeln soll die Fütterung sofort abgebrochen werden!

Vogelfutterhaus Finch wird von der Tschechischen Gesellschaft für Ornithologie empfohlen,
www.birdlife.cz



DIRECTIONS FOR LOCATION AND MAINTENANCE OF THE FINCH BIRD FEEDER

Finch is a small bird of the Fringillidae family. And it is the very bird family of finches, greenfinches or hawfinches that can become an adornment of your new FINCH bird feeder. Along with many other bird species which, particularly in the freezing weather, will find a regular supply of food more than welcome. Birds and people have been together since long ago, and just as our ancestors did, we admire their ability to fly and every spring we enjoy their singing. Birds are also very welcome in our gardens as they help to control insect pests. Thanks to feeding we can enjoy the close proximity of our feathered friends while helping them survive the tough winter season.

BIRD FEEDER LOCATION

There are three alternatives how the FINCH bird feeder can be located – hanging it, fixing it to a railing or perching it onto a freestanding bar. The Finch bird feeder can be for instance hung on a tree branch. In this case, however, you need to consider the possibility of a predatory attack by a cat or

a marten. If the bird feeder is located on a freestanding bar, the danger of attack will be significantly reduced. The bird feeder should be located at least 1, 5 m above the ground.

If the feeder is not hung, leave its roof fastened with the string and the retarder.

We usually locate bird feeders in an open-view, in a quiet part of garden without strong wind and with natural shelters such as trees and shrubs. These should not be closer than 2 meters, so that no predators could be hiding there.



We recommend to fix the feeder to railing with tightening strip about dimension 29 cm x 3,5 mm.

WHAT TO FEED

The birds are mainly fed fatty cereal seeds, especially sunflower seeds, possibly linseeds, millet seeds, buckwheat seeds, walnut or hazelnut kernels. We can offer oat flakes, unsalted bread, grated carrots or even fresh meat sliced into bits.

You can put apples under the bird feeder for blackbirds. Beef fat or marketed tallow balls can be hung next to the bird feeder.

Lift the roof of the feeder and fill the middle transparent part with the feeding.

Volume of part for feeding is 1,3 l.



A USEFUL TIP!!: If you remember little birds on your walks in the beginning of autumn when picking rosehips, rowan berries, elderberries, whitethorn

berries, buckthorn berries, ivy berries, dogwood berries, thistle seeds or when drying apples or plums, you will be able to prepare a real bird feast for all the birds from all around in winter time.

WHAT NOT TO FEED

The feeding must be first-rate and not rotten. We never feed the birds leftovers, pastry, pasta, smoked products, salted and spiced food. Freshly baked bread is absolutely inappropriate for birds, as it gives them digestion problems. Lard is not suitable as well, because unlike the beef fat birds have difficulty digesting it.

MAINTENANCE

The bird feeder needs to be cleaned regularly. We remove stoned seeds and seed coats, excrements and unconsumed food. If you notice birds that are obviously ill (malaise, dermal malformations around eyes and bill, wet feathers, etc.), stop the feeding for a while, sanitize the bird feeder and leave it to dry thoroughly to prevent etiological agents of the disease from spreading.

FOOD PREFERENCES

Woodpeckers – enjoy consuming beef fat or fat mixture best

Finches, greenfinches, yellowhammers, hawfinches, sparrows and blackbirds – cereal seeds, weed seeds and oilseeds.

Tits (great, marsh, blue, coal, crested), nuthatch, treecreeper – oilseeds, beef fat, fat mixture

Blackbirds and fieldfares – various berries, apples

Robin – bread crumbs, small seeds, fat mixture or, eventually, mealworms

WHEN TO FEED

Feeding should start in late autumn, ideally early in November. There is still enough of nurture in the nature at that time, the birds do not suffer from undernourishment and they will come to your bird feeder just to make their food more varied. Once there is a heavy frost and snow the birds know


exactly where the feeder is and how to get there. Feeding must be replenished regularly. It is convenient to increase the feeding quantities during freezing temperatures or snow. It is time to end the feeding when warm weather returns. If we still want to carry on feeding even during spring and summer, we have to make sure the bird feeder is clean to prevent the easy spread of infectious diseases in warm weather. If you notice any ill bird, stop the feeding instantly!

The Finch bird feeder is recommended by the Czech Society for Ornithology, www.birdlife.cz



urbalive

by plastia



PLASTIA s.r.o., Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4, Česká republika
tel.: +420 566 667 001, fax.: +420 566 667 005
www.plastia.eu